



ПЧЕНИЦА



Озимна сорта

ALCANTARA



ALCANTARA

СРЕДНО РАНСКА СОРТА

Густина на сеење: 400-450 'ртливи зрна/m²
Оптимално време на сеење: 5-20. Октомври



Главни особини

- Висок потенцијал на приноси**
Ниско стебло, добро брати и формира многу крупно зрно
- Широка адаптивност**
Продуктивна сорта во повеќе производствени услови, Толерантна на суша и стрес
- Добра здравствена состојба**
Многу толерантна на повеќето болести во тек на Целиот вегетациски период: и на лисната маса и на класот

Однесување на сортата надвор од препораките

Рана сеидба	8
Касна сеидба	8
Редка сеидба	9
Густа сеидба	6

Дистрибуција



www.bispromet.mk

тел.: 047 - 231 507
ул. Краварски пат б.б., Битола
bisprometagrocentar@gmail.com

+ 389 76 432 377
+ 389 75 207 095
+ 389 75 207 096

Агротехника

1. Ѓубрење - Потреба на пченицата од хранливи елементи
Азот- Фосфор - Калиум во однос 2: 1: 0.7

За остварување на 1 Т принос потребно е 20 кг. Распоред на ѓубрење: целокупната количина Р и К пред основната обработка + 1/3 N на есен пред сеидбата. Пр. Од 160 кг. Азот (вкупно потребно) - 1/3 (да се даде на есен) = 53 кг/ха
N:P:K 15:15:15 = 355 кг/ха

2. Основна обработка - не поплитко од 20 см - орање, тањирање, директна сеидба

3. Сеидба: Да се изврши во оптимален рок, по можност до 20 октомври. Количина ма семе: од 180 до 200 кг/ха во услови на добра предсеидбена припрема (добра агротехника), оптимален рок на сеидба спрема квалитетот на семето. Во услови на сеидба надвор од оптималниот рок, количината на семе треба да се зголеми.)

4. Прихрана: Прихраната да се изврши во два наврати спрема почвените анализи (N-min метод). Првиот пат рано на пролет, крајот на февруари, почетокот на март. Вториот пат што по касно, до појавата на првото колелце со цел да се обезбеди што повеќе протеини во зрното а со тоа да се осигура квалитетот на брашното.

Пример: Ако во есен сме дале 55 кг чист азот, на пролет треба да додадеме 160-55=105 кг чист азот

1. Прихрана 150 kg Urea 46%

2. Прихрана 100 kg AN 34%

5. Заштита Прв третман - фунгицид + хербицид напролет на почетокот на вегетацијата
Втор третман: фунгицид + инсектицид на почетокот на цветањето

Примерите се од информативен карактер. За додатни информации контактирајте ја нашата стручна служба.